

【 登園基準 】

	登園することができません	お迎えをお願いします	登園再開の目安
発熱	<ul style="list-style-type: none"> 朝の検温で 37.2℃を超えている 24 時間以内に 38.0℃以上の発熱があった、又は解熱剤を使用した 	<ul style="list-style-type: none"> 37.5℃以上の熱が続いている 	<ul style="list-style-type: none"> 朝の検温にて 37.2℃を超えていない
下痢	<ul style="list-style-type: none"> 24 時間以内に複数回の泥状便(柔らかく形がない便)～水様便や、嘔吐がある 	<ul style="list-style-type: none"> 嘔吐した 泥状便～水様便が出た 食事や水分が摂れない 	<ul style="list-style-type: none"> 前日の夜と登園当日の朝にいつも通りの食事が摂取でき、下痢や嘔吐をしていない →普通便が確認できていると理想的◎
嘔吐	<ul style="list-style-type: none"> 食事や水分を摂るとその刺激で嘔吐、下痢をする 下痢止めや吐き気止めを使用した 		
咳	<ul style="list-style-type: none"> 常時、鼻水や咳がでている 少し動いただけで咳が出る 	<ul style="list-style-type: none"> 常時、鼻水や咳が出ている 呼吸が苦しそう 	<ul style="list-style-type: none"> 症状が消失している 夜間、十分な睡眠がとれている
鼻水	<ul style="list-style-type: none"> ゼイゼイ音、ヒューヒュー音、呼吸困難感がある 夜間、咳が酷くて目が覚める 	<ul style="list-style-type: none"> お昼寝ができない ご飯が飲み込めない 	
発疹	<ul style="list-style-type: none"> 原因不明の発疹がある 口内炎が酷く、食事や水分が摂れない 発疹が顔面や指先などにあり、患部をガーゼ等で覆えない 浸出液が多い(他児への感染の恐れ) 痒みが強く患部を掻きむしってしまう 	<ul style="list-style-type: none"> 風邪症状とともに発疹がある 登園時よりも発疹が増えている 口内炎が酷く、食事や水分が摂れない 浸出液が多く、他児への感染の恐れがある 	<ul style="list-style-type: none"> 受診をし、発疹が感染性のものではない事、集団での生活に問題がない事が確認できている 発疹がガーゼ等で覆える程度である いつも通りの食事が摂れる
怪我	<ul style="list-style-type: none"> 24 時間以内に頭部や顔面を強打している 	<ul style="list-style-type: none"> 出血が止まらない 受診が必要と思われる怪我、頭部の怪我、活動に支障のある怪我をした 	<ul style="list-style-type: none"> 集団での生活に支障がない 受診をし、保育園での活動に問題がない事が確認できている
その他	<ul style="list-style-type: none"> 解熱剤や下痢止めなど、<u>頓用薬を服用しての登園はできません</u> 風邪薬を飲んでいる場合も基本的には同じ考えです。症状が回復していないのであれば登園は控えましょう 「機嫌が悪い」「活気がない」「食欲がない」は不調のサインです。お子さんの体調の変化にお気をつけください <p>【 体調不良で、早退・欠席したら… 】</p> <ul style="list-style-type: none"> 登園前日の 17 時までに園に連絡をお願いします お子さんの症状の経過をお聞きし、翌日の登園の可否を判断します 17 時の時点で体調が回復していない場合は、翌日もご家庭での療養をお願いします 		

※嘔吐・下痢に関しては、**登園前日 17 時までの連絡+登園当日の朝**にもご連絡をいただき、登園の可否を判断します